

# CONDUITE A TENIR

## Infanrix Quinta – Glaxosmithkline

	Dose 1 2 <sup>ème</sup> mois	Dose 2 3 <sup>ème</sup> mois	Dose 3 4 <sup>ème</sup> mois	Conduite à tenir		Dose supplémentai re au 5 <sup>ème</sup> mois	Rappel 12 <sup>ème</sup> mois	Rappel 16-18 <sup>ème</sup> mois	Conduite à tenir	Rappel 6 ans
2 doses potentiellement congelées	C ?	C ?	✓	Faire un dosage Anticorps antitétanos (Ac) un mois après	Si Ac >1 UI/ml			✓	/	✓
					Si 0,1 < Ac < 1 UI/ml		✓	/	✓	
					Si Ac < 0,1 UI/ml	✓	✓	/	✓	
	N	C ?	C ?	Faire un dosage Anticorps antitétanos (Ac) un mois après	Si Ac >1 UI/ml			✓	/	✓
					Si 0,1 < Ac < 1 UI/ml		✓	/	✓	
					Si Ac < 0,1 UI/ml	✓	✓	/	✓	
1 dose potentiellement congelée	C ?			Pour les enfants ayant reçu une dose de vaccin congelé en primovaccination, réadministrer une dose en respectant un délai d'au moins 1 mois puis reprendre le schéma habituel  ✓				✓	/	✓
	N	C ?						✓	/	✓
	N	N	C ?					✓	/	✓
	C ?	N						✓	/	✓
	N	N	N	/	/	/	/	C ?  Faire un dosage Anticorps antitétanos (Ac) un mois après	Si Ac >1 UI/ml	✓
								Si Ac < 1 UI/ml Faire une dose supplémentaire dans le mois suivant ✓	✓	

N : dose de vaccin normal

C ? : dose de vaccin potentiellement congelée

✓ : dose ultérieure à administrer